

QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

1 – POUR RÉDUIRE LE RISQUE INFECTIEUX POST-OPÉRATOIRE, L'ANTIBIOPROPHYLAXIE :

- *N'est qu'un moyen parmi d'autres* ☐
- *Est le point crucial de la stratégie de réduction des risques* ☐
- *N'est significativement efficace qu'adaptée à l'antibiogramme* ☐


• COMMUNICATION

DRS L. ESCARAVAGE, F. BRUYÈRE, P. COLOBY


CLERMONT-FERRAND TOURS

PONTOISE

- *Pour accéder au diaporama de la communication*



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

2 - LES INFECTIONS NOSOCOMIALES DU SITE OPÉRATOIRE REPRÉSENTENT :


- 25% des infections post-opératoires..... ☐
- 25% des infections nosocomiales..... ☐
- 25% des infections urologiques post-opératoires..... ☐

• **COMMUNICATION****DRS L. ESCARAVAGE, F. BRUYÈRE, P. COLOBY**

CLERMONT-FERRAND TOURS

PONTOISE

- Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

3- L'ANTIBIOPROPHYLAXIE NE S'ADRESSE :

- *Qu'aux patients non infectés non colonisés*..... ☐
- *Qu'aux patients non infectés mais colonisés*..... ☐
- *Qu'aux patients potentiellement infectés au niveau du site opératoire*..... ☐


• COMMUNICATION

DRS L. ESCARAVAGE, F. BRUYÈRE, P. COLOBY


CLERMONT-FERRAND TOURS

PONTOISE

- *Pour accéder au diaporama de la communication*



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

4- SELON LA CLASSIFICATION DE ALTEMEIER, LA CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE TRANS-URÉTRALE EST UNE CHIRURGIE :

- « *Propre* » ☐
- « *Contaminée* » ☐
- « *Propre-contaminée* » ☐


• COMMUNICATION

DRS L. ESCARAVAGE, F. BRUYÈRE, P. COLOBY

CLERMONT-FERRAND TOURS

PONTOISE

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

5- L'ANTIBIOPROPHYLAXIE NE DOIT JAMAIS ÊTRE POURSUIVIE :

- *Au-delà de la durée de l'intervention*..... ☐
- *Au delà de 24 heures*..... ☐
- *Au delà de 48 heures*..... ☐


• COMMUNICATION

DRS L. ESCARAVAGE, F. BRUYÈRE, P. COLOBY

CLERMONT-FERRAND TOURS

PONTOISE

- *Pour accéder au diaporama de la communication*



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

6- UNE ANTIBIOPROPHYLAXIE EST RECOMMANDÉE :

- *Lors des endoscopies diagnostiques*..... ☐
- *Lors d'une intervention avec ouverture de voies urinaires stériles*..... ☐
- *Lors d'une intervention chez un patient infecté*..... ☐


• COMMUNICATION

DRS L. ESCARAVAGE, F. BRUYÈRE, P. COLOBY


CLERMONT-FERRAND TOURS

PONTOISE

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

7- EN PER-OPÉRATOIRE, IL FAUT REFAIRE UNE ADMINISTRATION ANTIBIOPROPHYLACTIQUE :

- Toutes les $\frac{1}{2}$ vies de l'antibiotique..... ☐
- Toutes les $1,5 \frac{1}{2}$ vie de l'antibiotique..... ☐
- Toutes les $2 \frac{1}{2}$ vies de l'antibiotique..... ☐


• COMMUNICATION

DRS L. ESCARAVAGE, F. BRUYÈRE, P. COLOBY


CLERMONT-FERRAND TOURS

PONTOISE

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

8- UNE CANDIDURIE EST MISE EN ÉVIDENCE CHEZ :


- Jusqu'à 25% des patients hospitalisés ☐
- Jusqu'à 34% des patients hospitalisés ☐
- Jusqu'à 43% des patients hospitalisés ☐

• COMMUNICATION

DR A. SOTTO

Nîmes

- Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

9- LES ATTEINTES RÉNALES CANDIDOSIQUES SONT :


- *Tant hématogènes qu'ascendante* ☐
- *Essentiellement ascendantes* ☐
- *Essentiellement hématogènes* ☐

• COMMUNICATION


DR A. SOTTO

NÎMES

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

10 - L'INFECTION CANDIDOSIQUE UROLOGIQUE EST SYMPTOMATIQUE SUR LE PLAN URINAIRE :


- Dans 4% à 14% des infections..... ☐
- Dans 12% à 32% des infections..... ☐
- Dans 29% à 52% des infections..... ☐

• **COMMUNICATION**


DR A. SOTTO

NÎMES

- Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

11 - LAQUELLE DE CES RECHERCHES EST DISCRIMINANTE EN PRATIQUE CLINIQUE POUR LE DIAGNOSTIC D'INFECTION CANDIDOSIQUE RÉNALE :

- *Antigènes fongiques circulants* ☐
- *Séroconversion candidosique* ☐
- *Candidémie* ☐

• COMMUNICATION

DR A. SOTTO

NÎMES

■ Pour accéder au diaporama de la communication

