

QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

1 - ON RETROUVE UNE INSTABILITÉ DÉTRUSORIENNE EN CAS DE POP :


- Dans 10% à 20% des cas ☐
- Dans 20% à 30% des cas ☐
- Dans 40% à 50% des cas ☐

• COMMUNICATION

DR B. BALLANGER

BORDEAUX

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

2 - LA CHIRURGIE DU PROLAPSUS EST EFFICACE SUR LES SYMPTÔMES D'IRRITATION VÉSICALE :


- Dans 86% des cas..... ☐
- Dans 63% des cas..... ☐
- Dans 54% des cas..... ☐

- **COMMUNICATION**

DR B. BALLANGER

BORDEAUX

- Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

3 - APRÈS CURE DE PROLAPSUS PAR VOIE HAUTE, LA VIE SEXUELLE EST RAPPORTÉE COMME ALTÉRÉE POUR :


- *Moins de 10% des patientes* ☐
- *Environ 20% des patientes* ☐
- *Près du tiers des patientes* ☐

• COMMUNICATION

DR B. FATTON

CLERMONT-FERRAND

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

4- LA VIE SEXUELLE APRÈS CURE DE PROLAPSUS EST :


- *Essentiellement altérée après chirurgie par voir basse*..... ☐
- *Essentiellement altérée après chirurgie par voie haute*..... ☐
- *Altérée de façon sensiblement comparable après les deux voies d'abord*..... ☐

• COMMUNICATION

DR B. FATTON

CLERMONT-FERRAND

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION


5 - LA DYSPAREUNIE APRÈS POSE DE PROTHÈSE PAR VOIE VAGINALE :

- *Peut relever d'un raccourcissement vaginal*..... ☐
- *Est en règle directement liée à la prothèse*..... ☐
- *Est le plus souvent d'origine infectieuse*..... ☐

• **COMMUNICATION****DR B. FATTON**

CLERMONT-FERRAND

- *Pour accéder au diaporama de la communication*



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

6 - UNE DIMINUTION POST-OPÉRATOIRE DES SENSATIONS SEXUELLES RELÈVE D'UNE LÉSION TRAUMATIQUE :


- Du nerf ilio-inguinal..... ☐
- Du nerf pudendal..... ☐
- Du nerf clunéal..... ☐

• COMMUNICATION

DR J.-J. LABAT & J. RIGAUD

NANTES

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

7 - UNE DOULEUR NEUROPATHIQUE DE LA FACE ANTÉRO-INTERNE DE LA CUISSE MAJORÉE À LA MARCHÉ ET SANS DÉFICIT SENSITIVO-MOTEUR, ÉVOQUE :


- Une neurolyse du nerf ilio-inguinal..... ☐
- Une névralgie obturatrice..... ☐
- Un syndrome canalaire pudendal..... ☐

• COMMUNICATION

DR J.-J. LABAT & J. RIGAUD

NANTES

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

8- DEUX POINTS DOULOUREUX SONT PARTICULIERS AU SYNDROME MYOFASCIAL DU MUSCLE OBTURATEUR INTERNE, LESQUELS ?


- *Fessier et pelvien* ☐
- *Inguinal et pelvien* ☐
- *Inguinal et vulvaire* ☐

• COMMUNICATION

DR J.-J. LABAT & J. RIGAUD

NANTES

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

9 - QUELLE EST LA FRÉQUENCE DES TROUBLES SPHINCTÉRIENS ANAUX DANS LE PROLAPSUS GÉNITAL ?


- 10% ☐
- 30% ☐
- 50% ☐

• COMMUNICATION

DR D. SALET-LIZÉE

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

10 - UN PROLAPSUS GÉNITAL POSTÉRIEUR SERA TRAITÉ AU MIEUX PAR :


- Voie transanale..... ☐
- Voie vaginale..... ☐
- Prothèse vaginale..... ☐

• COMMUNICATION

DR D. SALET-LIZÉE

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

11 - QUELLE EST LA CAUSE D'UNE DIMINUTION DU SEUIL DE SENSIBILITÉ RECTALE APRÈS PROMONTOFIXATION ?

- *Verticalisation excessive de l'axe rectovaginal*..... ☐
- *Altération tissulaire lors de la dissection latéroréctale*..... ☐
- *Excès de rigidité prothétique*..... ☐

• COMMUNICATION

DR D. SALET-LIZÉE

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication

