

# Fiche suites d'intervention



Dernière mise à jour : octobre 2014

## INSTILATION ENDOVESICALE D'AMETYCINE<sup>®</sup> (MITOMYCINE C)

Cette fiche d'information, rédigée par l'Association Française d'Urologie, est destinée aux patients ainsi qu'aux usagers du système de santé.

Remise lors de votre sortie, elle vous explique les suites opératoires habituelles et elle vous donne les principales consignes de sécurité post-opératoires.

Vous sont exposés ici, les effets secondaires habituels et les troubles mineurs qui ne doivent pas vous inquiéter. Sont également énoncés les signes plus alarmants qui doivent vous amener à prendre un avis médical et leur degré d'urgence.

Ce document, complémentaire de l'information orale que vous avez reçue de votre urologue, vous permet au mieux d'aborder votre convalescence.

Vous venez de subir une ou plusieurs instillation(s) endovésicale(s) d'Amétycine<sup>®</sup> (Mitomycine C)

### Informations générales

Il vous a été demandé de garder le produit dans la vessie sans uriner pendant deux heures après l'instillation et d'uriner assis sur les toilettes. Les cuvettes des WC que vous utiliserez pendant les 6 heures suivant l'instillation, devront être nettoyées à l'eau de Javel non diluée.

Vous devez aussi laver soigneusement vos mains et vos parties génitales après avoir uriné pendant les 24 premières heures.

Il est recommandé de boire abondamment (2 à 3 litres par jour) et régulièrement.

Il est préférable d'éviter les rapports sexuels pendant 24 heures, ainsi que les efforts et les voyages.

Ce traitement peut vous fatiguer et être responsable d'effets secondaires. Certains sont fréquents, gênants, mais sans danger ; d'autres sont rares et nécessitent une prise en charge rapide.

## Signes mineurs qui peuvent survenir habituellement

Des signes urinaires peuvent apparaître après l'instillation :

- ◆ Les urines peuvent être teintées de sang
- ◆ Un saignement par l'urètre en dehors des mictions (urétrorragie)
- ◆ Des brûlures de la vessie notamment en urinant
- ◆ Des « débris » dans les urines

Ces signes peuvent persister pendant quelques jours, mais doivent diminuer progressivement. S'ils persistent, ils peuvent nécessiter des traitements spécifiques et une adaptation du traitement par votre urologue.

#### Attention :

Le tabac augmente considérablement le risque de difficulté de cicatrisation interne et externe. Il est donc expressément recommandé de ne pas fumer durant la convalescence.

Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, votre chirurgien et votre anesthésiste ou appelez la ligne Tabac-Info-Service au 3989 pour vous aider à réduire les risques et mettre toutes les chances de votre côté.

## Signes qui nécessitent un avis médical urgent auprès de votre urologue ou du service d'urgences

- ◆ Majoration des signes précédemment décrits
- ◆ Fièvre > 38 ° 5 C
- ◆ Douleur testiculaire ou augmentation du volume d'une bourse
- ◆ Douleurs articulaires
- ◆ Réaction cutanée, y compris la paume des mains (rougeur, éruption, démangeaisons...)
- ◆ Douleurs abdominales intenses

Les informations qui vous sont données ci dessus concernent les suites opératoires classiques avec les effets secondaires indésirables les plus fréquents. Ce document n'est pas exhaustif. Certains risques y compris vitaux peuvent tenir à des variations individuelles qui ne sont pas toujours prévisibles.

\* L'Association Française d'Urologie n'assume aucune responsabilité propre en ce qui concerne les conséquences dommageables éventuelles pouvant résulter de l'exploitation des données extraites des documents, d'une erreur ou d'une imprécision dans le contenu des documents.

Votre urologue se tient à votre disposition pour tout renseignement.